なめらかな半径 r の半球形のおわんが水平に固定されている。質量 M の小球 P と質量 m ($M > m$) の小球 Q を $2r$ より長い軽くて伸びない糸で結び、図のように P をおわんの内側に入れて、おわんの縁 A に糸をかける。重力加速度の大きさを g とし、 P の位置は球の中心 O を中心とした角度 $\angle AOP = \theta$ で測るものとする。以下の問1、問2のそれぞれの場合について答えよ。

※ このようなタイプの問題は昔は良く見かけたが、最近は余り見かけなくなった。糸口さえ見つければ簡単なのだが、別解も含めて解答までの道のりは面白いところが多い。

問1 小球 P が $\theta = \frac{\pi}{3}$ でつりあった。この場合、 M 、 m の間に成り立つ関係を求めよ。また、おわんから P に働く抗力の大きさを M 、 g で求めなさい。

問2 小球 P を A のすぐ内側 ($\theta = 0$) で静かに放すと、下方へ滑り出した。この場合について、以下の問いに答えよ。

(1) 放した直後に糸が P を引く力の大きさを M 、 m 、 g で求めなさい。

(2) 小球 P が最下点 $\theta = \frac{\pi}{2}$ を通過するために必要な M 、 m の間の条件を不等式で表せ。

(3) 小球 P が図のように角 θ の点を通りかかるとき、 P の速さ V と Q の速さ v の間に成り立つ関係を求めよ。また、 V を r 、 g 、 M 、 m 、 θ で表せ。

(4) 小球 P が $\theta = \theta_c$ の点に達したとき速度ゼロになった。このとき Q は、はじめの位置から h だけ上昇していた。 $\cos \frac{\theta_c}{2}$ を M 、 m で表し、 h を r 、 M 、 m で表せ。

(5) その後、 P と Q はそれぞれどのような運動を続けるか述べよ。ただし、 $\theta_c > 0$ とする。

入試問題研究 第75回 2004年 大阪市立大学 力のつりあい

問1 Pの重力は Mg 、糸の張力が mg 、わんからの垂直抗力 N の3力のつりあいになる。 $\theta = \frac{\pi}{3}$ であるので、 $Mg = mg \cos 30^\circ \times 2$ だから、 $M = \sqrt{3}m$ の関係が成立している。

問2

(1) 放した直後、Pは鉛直に落下する。よって、Pは下向きに加速度 a 、Qは上向きに a である(それぞれの運動は鉛直方向)。運動方程式は、Pが $Ma = Mg - T \cdots \textcircled{1}$ 、Qが $ma = T - mg \cdots \textcircled{2}$ だから、加速度が $a = \frac{(M-m)g}{M+m}$ になり、糸が引く力は $T = \frac{2Mmg}{M+m}$ である。

(2) 手を離れたときと小球Pが最下点 $\theta = \frac{\pi}{2}$ を通過するときにおいて、力学的エネルギー保存の法則を適用すると $Mg \times r = mg \times \sqrt{2}r + \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2$ の関係式が成立する。運動エネルギーが存在すれば、小球Pが最下点 $\theta = \frac{\pi}{2}$ を通過できる。よって、 $M > \sqrt{2}m$ であれば良い。

(3) 「Qの速さはAPの長さの時間微分したもの」になる。Pの速さを V とすると、 $V = r\omega$ である。APの長さは $L = 2r \sin \frac{\theta}{2} \cdots \textcircled{3}$ である。③を時間 t で微分すると、 $\frac{dL}{dt} = 2r \cos \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{2} \frac{d\theta}{dt}$ である。
 $\frac{d\theta}{dt} = \omega$ 、 $\frac{dL}{dt} = v$ だから、 $v = r\omega \cos \frac{\theta}{2}$ より、 $v = V \cos \frac{\theta}{2} \cdots \textcircled{4}$ になる。

力学的エネルギー保存の法則より $Mgr \sin \theta = mg \cdot 2r \sin \frac{\theta}{2} + \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2$ が成立する。④を代入して $Mgr \sin \theta = mg \cdot 2r \sin \frac{\theta}{2} + \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mV^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$ であるから、小球Pの速度は

$$V = \sqrt{\frac{2gr \left(M \sin \theta - 2m \sin \frac{\theta}{2} \right)}{M + m \cos^2 \frac{\theta}{2}}} \cdots \textcircled{5} \text{ と表される。}$$

(4) Qが h だけ上昇したので、APの長さは h であるから、③より $h = 2r \sin \frac{\theta_c}{2} \cdots \textcircled{6}$ である。

そのとき速度ゼロになるから、⑤より $M \sin \theta_c - 2m \sin \frac{\theta_c}{2} = 0$ が成立する。⑤式に倍角公式を適用して $2M \sin \frac{\theta_c}{2} \cos \frac{\theta_c}{2} - 2m \sin \frac{\theta_c}{2} = 0$ である。よって、 $\cos \frac{\theta_c}{2} = \frac{m}{M} \cdots \textcircled{7}$ である。

⑥より $\cos \frac{\theta_c}{2} = \sqrt{1 - \left(\frac{h}{2r} \right)^2}$ だから、⑦に代入して $\frac{m}{M} = \sqrt{1 - \left(\frac{h}{2r} \right)^2}$ が成立する。これより h を求めると、 $h = 2r \sqrt{1 - \left(\frac{m}{M} \right)^2}$ である。

(5) 速度0になった位置でのPが受ける力の球面に沿った方向成分は $F = Mg \cos \theta_c - mg \cos \frac{\theta_c}{2}$

である。⑦を代入して $F = 2Mg \left(\frac{m}{M} \right)^2 - Mg - mg \left(\frac{m}{M} \right) = \frac{2m^2g - M^2g - m^2}{M} = \frac{(m^2 - M^2)g}{M} < 0$ で

あるので、Pは速度ゼロの後バックし始める。摩擦が無いので力学的エネルギー保存の法則が成立するので、P、Qは往復運動を繰り返す。